

LES ROSES.

- β. R. *Collina fastigiata*. R. (*Fastigiata*) calycum tubis ovatis, glabris; pedunculis hispidis; petiolis pubescentibus aculeatis; foliis ovato-lanceolatis subius pubescentibus; floribus fastigiatis. BAST. Supp. p. 30. DC. Fl. Franç. édit. 3, vol. 6, p. 535. POIR. Encyc. Supp. p. 711.
 R. (*Canina fastigiata*). DESV. Journ. Bot. septembre 1813, p. 114, var. ε.
 R. (*Collina*). NOUV. DUHAM. l. c. Se trouve dans l'Anjou et le haut Poitou. Nous croyons que le R. *Umbellata* de LEYSER est le même. Voyez *Flora Halensis*. édit. 1, p. 435.
 γ. R. *Collina pilosuscula*. R. (*Canina pilosuscula*). DESV. l. c.
 R. (*Collina*). NOUV. DUHAM. l. c.

** Pédoncules et tubes des calices glabres.

- δ. R. *Collina glabra*. R. *Collina* DC. Fl. Franç. 3702. Excl. Syn. α et β. MERAT, Fl. de Paris, p. 191. Excl. Syn. NOUV. DUHAM. l. c. Non JACQ. Non SUTH. Non POIRET, etc.
 R. (*Canina collina*). DESV. l. c. var. δ. Vulg. le Rosier des collines à pédoncules glabres.
 ε. R. *Collina decipiens*. R. (*Canina decipiens*). DESV. l. c. var. υ.
 R. (*Collina*). NOUV. DUHAM. l. c.
 ζ. R. *Collina dumetorum*. R. (*Dumetorum*). THUILL. Fl. de Paris, édit. 2, p. 250. LE JEUNE, Fl. de Spa, 1, p. 331. LOIS. Fl. Franç. 1, p. 297.
 R. (*Canina dumetorum*). DESV. l. c. var. ζ. Vulg. le Rosier des Collines à grandes feuilles; le Rosier des buissons.
 Le R. *Platyphylla* de M. RAU, En. Ros. p. 82, ne nous paraît être qu'une sous-variété de celle-ci, remarquable, il est vrai, par la grande dimension de ses folioles.
 η. R. *Collina mollis*. R. (*Canina mollis*). DESV. l. c. var. ο.
 R. (*Collina*). NOUV. DUHAM. l. c.
 θ. R. *Collina microcarpa*. R. (*Canina microcarpa*). DESV. l. c. var. ρ.
 R. (*Collina*). NOUV. DUHAM. l. c.
 ι. R. *Collina subvillosa*. R. (*Canina subvillosa*). DESV. l. c. var. π.
 R. (*Collina*). NOUV. DUHAM. l. c.

Peut-être faudrait-il joindre à ces variétés les R. *Leucantha* et *Fœtida* (tome 1^{er} de cet ouvrage, p. et fig. 129 et 131).

On voit que la réunion de ces arbustes est principalement fondée sur les folioles simplement dentées, glabres en-dessus, tomenteuses en-dessous et sur leur bordure, caractères suffisants pour faire distinguer les R. *Collina* des autres espèces sauvages avec lesquelles on les confond souvent.

En effet, le R. *Canina* s'en éloigne par ses folioles plus arrondies, glabres des deux côtés, et par-fois surdentées.

Le R. *Villosa*, par ses folioles tomenteuses des deux côtés.

Le R. *Andegavensis*, par ses tubes hérissés, et ses folioles glabres.

Le R. *Montana*, par ses folioles bidentées, glabres en-dessous, seulement glanduleuses en leur bord.

Enfin le R. *Sepium* diffère du R. *Collina*, par ses folioles aussi surdentées, couvertes de glandes en-dessous comme sur leur bordure. Ces mêmes folioles sont d'ailleurs plus petites, en général, dans cette dernière espèce.